



即刻保护孩子远离 脊髓灰质炎

我的孩子应该接种脊髓灰质炎疫苗吗？

所有宝宝都应在 6 周至 2 个月大时开始接种脊髓灰质炎疫苗，以获得预防脊髓灰质炎所需的安全保护。孩子在 2 岁前共应接种三剂疫苗，并应在上学前完成第四剂疫苗的接种。

如果您的孩子还未接种脊髓灰质炎疫苗，没有按时完成脊髓灰质炎疫苗接种计划，或者您不太确定孩子的脊髓灰质炎疫苗接种状态，请立即联系医疗保健提供者。

包括儿童在内的许多纽约人可能都未能按时完成常规的医疗保健问诊，您孩子的医疗保健提供者将确保孩子及时接种所有推荐疫苗剂量或赶上接种进度。

脊髓灰质炎疫苗接种计划

剂量编号	年龄
第 1 剂	6 周至 2 个月
第 2 剂	4 个月
第 3 剂	6 个月至 18 个月
第 4 剂	4 至 6 岁

为何我的孩子需要按时接种脊髓灰质炎疫苗？

孩子始终需要预防脊髓灰质炎。事实上，按时完成脊髓灰质炎疫苗接种计划是纽约公立或私立日托中心或学校对所有学龄儿童的一项入学要求。

但值得注意的是，孩子们甚至在进入日托中心或学校之前，就必须按时接种脊髓灰质炎疫苗。未按时接种脊髓灰质炎疫苗的儿童则面临感染病毒并发展成严重疾病（包括瘫痪）的风险。由脊髓灰质炎引起的瘫痪（即无法移动身体的某些部位）通常是永久性的，从而导致终身残疾。

为何我的孩子现在有患上脊髓灰质炎的风险？

7 月 21 日，Rockland County 发现了一起年轻人患上脊髓灰质炎的病例，该成人未接种过脊髓灰质炎疫苗。这名患者出现了包括瘫痪在内的严重症状，并接受了住院治疗。通过废水监测发现，目前已在 Rockland County、Orange County、Sullivan County 和 New York City 的废水中检测出了脊髓灰质炎病毒的迹象，这意味着病毒很可能已经开始在这些社区内传播（当个体感染了脊髓灰质炎病毒，即使他们没有任何症状，也可能通过粪便传播病毒）。目前还没有治愈脊髓灰质炎的办法，但您可以通过确保孩子按时接种疫苗来帮助他们预防这种疾病。

任何未按时接种脊髓灰质炎疫苗的儿童，尤其是在已检测出脊髓灰质炎病毒的地区，都有罹患严重脊髓灰质炎疾病的风险。

什么是脊髓灰质炎？

脊髓灰质炎是一种可以导致人体衰弱并且危及生命的疾病。脊髓灰质炎病毒可以影响人的大脑和脊髓，从而导致瘫痪（即无法移动身体的某些部位）甚至死亡。因此，脊髓灰质炎这种疾病非常危险，特别是对未接种或者未按时接种脊髓灰质炎疫苗的幼儿而言。

脊髓灰质炎病毒是如何传播的？

- 脊髓灰质炎具有很强的传染性，即使人们没有出现任何症状或不知道自己感染病毒，也可能传播病毒。
- 脊髓灰质炎病毒通过感染者的粪便、喷嚏或咳嗽飞沫在人与人之间传播。
- 当某人与脊髓灰质炎患者密切接触时，例如照顾他们、与他们一起玩耍或者分享食物或器具，就可能出现传染现象。
- 对于经常成群结队玩耍或集体接受照护的幼儿来讲，传染风险更甚。小孩子也可能无法像成年人那样坚持用肥皂和水洗手。
- 此外，纽约人还应该明白，酒精消毒液并不能杀灭所有类型的病菌，包括脊髓灰质炎病毒。

我的孩子怎样才能接种脊髓灰质炎疫苗？

所有儿科医生和家庭医疗保健提供者，包括诊所内为儿童提供服务的医疗保健提供者，都可以为您的孩子接种脊髓灰质炎疫苗。请联系一名医疗保健提供者或者您当地的县卫生部门，尽快为孩子预约接种脊髓灰质炎疫苗。

我的孩子接种的是哪种疫苗？

您的孩子将接种灭活脊髓灰质炎疫苗 (inactivated polio vaccine, IPV)，这是在美国可以接种的唯一一款疫苗。IPV 安全有效。在接种完所有推荐疫苗剂量的儿童中，IPV 可以保护 99% 的儿童免于疾病危害，包括瘫痪。根据接种者的年龄，疫苗接种将在手臂或者腿部进行。重要的是，儿童需要接种完所有推荐剂量，以尽可能获得最佳保护。


这种疫苗有任何副作用吗？

IPV 是一款公认非常安全的疫苗。大多数孩子接种该疫苗没有任何不良反应，您的孩子在接种疫苗后可能不会出现任何变化。然而，类似于其他疫苗，您的孩子在接种完成后也可能会感到些许不适。例如，孩子的接种部位可能会有痛感。通常来讲，这些症状都很轻微，几天之后便会自行消失。

立即为孩子预约脊髓灰质炎疫苗接种。

想了解更多信息？

health.ny.gov/polio



Department
of Health